

# FUMYCO

## Pupuk Hayati Mikoriza



**FUMYCO** merupakan pupuk hayati mikoriza hasil proses bioteknologi ramah lingkungan yang digunakan sebagai imunisasi tanaman di pembibitan dengan manfaat :

- Meningkatkan kemampuan akar dalam penyerapan air dan unsur hara (terutama unsur P)
- Memperkuat akar dan melindungi tanaman dari serangan Ganoderma
- Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman

## AGRO HAYATI SPESIALIS

### HUBUNGI KAMI

Phone

021 87946635

Website

[www.saraswanti-ash.com](http://www.saraswanti-ash.com)

Email

[ash@saraswanti.com](mailto:ash@saraswanti.com)

Address

Kampung Nagrog, Rt 003 Rw 002,  
Sukahati, Citeureup, Bogor (16810)



### PETUNJUK TEKNIS FUMYCO DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



**PT ANUGERAH SARANA HAYATI**

## ATURAN PENGGUNAAN FUMYCO

- Sebelum kemasan dibuka, **Fumyco** dibolak balik terlebih dahulu supaya spora tercampur merata dalam media zeolite.
- **Fumyco** dituang secara perlahan-lahan agar spora tidak terbang bersama debu zeolite.

## APLIKASI FUMYCO DI PRE NURSERY

- **Fumyco** dosis 20 gr ditaburkan pada dasar lubang tanam.
- Kecambah kelapa sawit ditanam ke lubang tanam yang telah ditabur dengan **Fumyco** (Radikula atau calon akar harus kontak langsung dengan **Fumyco**).
- Lubang tanam ditutup kembali dengan tanah.

## APLIKASI FUMYCO DI MAIN NURSERY

- **Fumyco** dosis 30 gr ditaburkan pada dasar lubang tanam (**Fumyco** harus kontak langsung dengan akar).
- Bibit dimasukkan dalam lubang, kemudian media tanam dipadatkan kembali.
- Jika tahap penanaman MN terlewat, aplikasi **Fumyco** dapat dilakukan dengan pembuatan 4 lubang pada media tanam sedalam 10 cm dengan metode tugal.
- **Fumyco** dengan dosis 20 gr ditaburkan pada setiap titik.
- Lubang ditutup kembali dengan tanah.

## APLIKASI FUMYCO SAAT PENANAMAN

- **Fumyco** dosis 100 gr dimasukkan pada dasar lubang tanam (**Fumyco** harus kontak langsung dengan akar).
- Kemudian bibit dimasukkan dalam lubang, lalu tanah kembali dipadatkan.

## APLIKASI FUMYCO DI TBM & TM

- Membuat lubang sedalam 5 cm di sekitar piringan di bawah tajuk.
- **Fumyco** dosis 200-250 gr ditaburkan pada piringan tersebut dan kemudian ditutup kembali dengan tanah.



● SIMPAN PADA TEMPAT KERING & TERLINDUNG DARI AIR ●